



Radiologische Gemeinschaftspraxis **Rechener Str. 3a / 4 – 44787 Bochum**

Dr. U. Rehwald, Dr. A. Plewka, Dr. E. Vollrath
Dr. M. E. Hamami-Arlinghaus

Fachärzte für Radiologie
Fachärztin für Nuklearmedizin

Patienteninformation zur Schilddrüsenszintigraphie

Wann wird die Untersuchung veranlasst?

- Vorliegen von Schilddrüsenknoten (getastet oder mit Hilfe von Ultraschall entdeckt).
- Verdacht auf eine Funktionsstörung der Schilddrüse.
- Vergrößerung der Schilddrüse.
- Verdacht auf eine Fehllage der Schilddrüse.

Wie können Sie sich auf die Untersuchung vorbereiten?

- Bringen Sie die Medikamente (v.a. Medikamente für die Schilddrüse) mit, die Sie zurzeit einnehmen.
- Eine Untersuchung (z.B. Computertomographie oder Katheteruntersuchung) mit jodhaltigem Kontrastmittel sollte mindestens 6 Wochen zurückliegen.

Ablauf:

20 Minuten nach Injektion eines schwach radioaktiven Stoffes wird eine Aufnahme im Sitzen an einer Kamera durchgeführt. Diese Aufnahme dauert etwa 10 Minuten.